

表 1360 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 治療方法別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

治療方法	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	5,123 (91.2)	372 (6.6)	22 (0.4)	51 (0.9)	49 (0.9)	5,617 (100.0)	182	608	6,407
血液透析濾過 (%)	1,530 (91.9)	108 (6.5)	3 (0.2)	13 (0.8)	10 (0.6)	1,664 (100.0)	46	162	1,872
血液濾過 (%)									
血液吸着透析 (%)	44 (83.0)	7 (13.2)		1 (1.9)	1 (1.9)	53 (100.0)	2	5	60
在宅血液透析 (%)	86 (96.6)	2 (2.2)		1 (1.1)		89 (100.0)	1	8	98
腹膜透析 (%)	5,572 (99.3)	24 (0.4)	1 (0.0)	8 (0.1)	5 (0.1)	5,610 (100.0)	47	3,112	8,769
合計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206
記載なし (%)									
総計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査