

表 1362 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 併用の状況別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

併用の状況	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	6,605 (%)	488 (91.3)	24 (6.7)	64 (0.3)	57 (0.9)	7,238 (100.0)	228	758	8,224
PD単独	4,421 (%)	14 (99.4)	1 (0.3)	7 (0.0)	3 (0.2)	4,446 (100.0)	33	2,625	7,104
HD(F)単独,PDカテあり	120 (%)	1 (94.5)	1 (0.8)	2 (0.8)	3 (1.6)	127 (100.0)	2	16	145
PD.HD併用週1	1,007 (%)	9 (98.8)		1 (0.9)	2 (0.1)	1,019 (100.0)	14	437	1,470
PD.HD併用週2	125 (%)					125 (100.0)	1	39	165
PD.HD併用週3	23 (%)					23 (100.0)		4	27
PD.HD併用週4									
HD(F) (%)									
PD.HD併用その他	52 (%)	1 (98.1)				53 (100.0)		16	69
合計	12,353 (%)	513 (94.8)	26 (3.9)	74 (0.2)	65 (0.6)	13,031 (100.0)	278	3,895	17,204
不明	2 (%)					2 (100.0)			2
記載なし									
総計	12,355 (%)	513 (94.8)	26 (3.9)	74 (0.2)	65 (0.6)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査