

表 1363 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 性別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

性別	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	8,025 (95.1)	304 (3.6)	18 (0.2)	46 (0.5)	45 (0.5)	8,438 (100.0)	168	2,521	11,127
女性 (%)	4,330 (94.2)	209 (4.5)	8 (0.2)	28 (0.6)	20 (0.4)	4,595 (100.0)	110	1,374	6,079
合計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206
記載なし (%)									
総計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査