

表 1364 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

年齢	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	64 (100.0)					64 (100.0)		29	93
15歳～ (%)	149 (99.3)		1 (0.7)			150 (100.0)	4	44	198
30歳～ (%)	974 (94.7)	44 (4.3)	1 (0.1)	5 (0.5)	4 (0.4)	1,028 (100.0)	31	309	1,368
45歳～ (%)	3,289 (94.6)	146 (4.2)	10 (0.3)	19 (0.5)	12 (0.3)	3,476 (100.0)	61	1,036	4,573
60歳～ (%)	5,770 (94.3)	259 (4.2)	13 (0.2)	37 (0.6)	40 (0.7)	6,119 (100.0)	138	1,749	8,006
75歳～ (%)	2,002 (96.0)	63 (3.0)	1 (0.0)	11 (0.5)	9 (0.4)	2,086 (100.0)	42	678	2,806
90歳～ (%)	107 (97.3)	1 (0.9)		2 (1.8)		110 (100.0)	2	50	162
合計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206
不明 (%)									
記載なし (%)									
総計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206
平均	62.36	62.02	58.85	64.09	63.92	62.36	62.56	62.58	62.41
標準偏差	13.52	11.69	13.21	12.64	10.64	13.34	13.11	14.07	13.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査