

表 1365 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

透析歴	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,998 (99.1)	16 (0.5)		5 (0.2)	6 (0.2)	3,025 (100.0)	37	1,335	4,397
2年～ (%)	3,015 (97.5)	53 (1.7)	6 (0.2)	14 (0.5)	4 (0.1)	3,092 (100.0)	49	1,285	4,426
5年～ (%)	3,013 (95.6)	103 (3.3)	5 (0.2)	18 (0.6)	13 (0.4)	3,152 (100.0)	81	766	3,999
10年～ (%)	1,514 (91.5)	102 (6.2)	4 (0.2)	15 (0.9)	19 (1.1)	1,654 (100.0)	40	260	1,954
15年～ (%)	857 (87.9)	96 (9.8)	3 (0.3)	10 (1.0)	9 (0.9)	975 (100.0)	33	119	1,127
20年～ (%)	512 (82.6)	85 (13.7)	6 (1.0)	8 (1.3)	9 (1.5)	620 (100.0)	22	70	712
25年～ (%)	230 (81.9)	45 (16.0)	1 (0.4)	1 (0.4)	4 (1.4)	281 (100.0)	6	30	317
30年～ (%)	107 (87.0)	11 (8.9)	1 (0.8)	3 (2.4)	1 (0.8)	123 (100.0)	5	12	140
35年～ (%)	57 (96.6)	2 (3.4)				59 (100.0)	2	2	63
40年～ (%)	46 (100.0)					46 (100.0)	3	2	51
合計 (%)	12,349 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,027 (100.0)	278	3,881	17,186
不明 (%)	6 (100.0)					6 (100.0)		14	20
記載なし (%)									
総計 (%)	12,355 (94.8)	513 (3.9)	26 (0.2)	74 (0.6)	65 (0.5)	13,033 (100.0)	278	3,895	17,206
平均	7.07	14.06	12.85	11.12	12.40	7.62	9.95	4.39	6.77
標準偏差	7.45	8.00	8.65	7.89	7.48	7.66	8.44	5.37	7.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査