

表 1367 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 医療機関別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

医療機関	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	440	2				442		248	690
(%)	(99.5)	(0.5)				(100.0)			
私立大学	643	8			1	652	7	528	1,187
(%)	(98.6)	(1.2)			(0.2)	(100.0)			
国立	195		2	1	2	200		77	277
(%)	(97.5)		(1.0)	(0.5)	(1.0)	(100.0)			
県市町村立	1,643	45		20	3	1,711	37	662	2,410
(%)	(96.0)	(2.6)		(1.2)	(0.2)	(100.0)			
社会保険	369	10		1	3	383	3	359	745
(%)	(96.3)	(2.6)		(0.3)	(0.8)	(100.0)			
厚生連	628	24		4	2	658	10	240	908
(%)	(95.4)	(3.6)		(0.6)	(0.3)	(100.0)			
その他公的	1,233	22	2	5	4	1,266	30	495	1,791
(%)	(97.4)	(1.7)	(0.2)	(0.4)	(0.3)	(100.0)			
私立総合	456	17	1	1	1	476	4	47	527
(%)	(95.8)	(3.6)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(100.0)			
私立	2,555	139	7	10	13	2,724	70	822	3,616
(%)	(93.8)	(5.1)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(100.0)			
私立診療所	4,193	246	14	32	36	4,521	117	417	5,055
(%)	(92.7)	(5.4)	(0.3)	(0.7)	(0.8)	(100.0)			
総計	12,355	513	26	74	65	13,033	278	3,895	17,206
(%)	(94.8)	(3.9)	(0.2)	(0.6)	(0.5)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査