

表 1398 降圧薬使用の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	64,920	132,857	197,777	900	50,048	248,725
(%)	(32.8)	(67.2)	(100.0)			
Off-line HDF	1,569	2,581	4,150	19	1,163	5,332
(%)	(37.8)	(62.2)	(100.0)			
On-line HDF	12,023	23,277	35,300	77	9,150	44,527
(%)	(34.1)	(65.9)	(100.0)			
Push/Pull HDF	23	62	85		25	110
(%)	(27.1)	(72.9)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	114	117	231	1	35	267
(%)	(49.4)	(50.6)	(100.0)			
IHDF	1,072	1,878	2,950		590	3,540
(%)	(36.3)	(63.7)	(100.0)			
血液濾過	5	6	11		5	16
(%)	(45.5)	(54.5)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル等使用)	644	566	1,210	3	163	1,376
(%)	(53.2)	(46.8)	(100.0)			
在宅血液透析	224	175	399	3	153	555
(%)	(56.1)	(43.9)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	748	2,519	3,267	14	1,621	4,902
(%)	(22.9)	(77.1)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	403	1,531	1,934	8	833	2,775
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	144	628	772	14	306	1,092
(%)	(18.7)	(81.3)	(100.0)			
合計	81,889	166,197	248,086	1,039	64,092	313,217
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	81,889	166,197	248,086	1,039	64,092	313,217
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査