

表 1399 降圧薬使用の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	80,515	161,364	241,879	1,002	61,282	304,163
(%)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
PD単独	1,013	3,706	4,719	26	2,359	7,104
(%)	(21.5)	(78.5)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテあり	44	106	150		32	182
(%)	(29.3)	(70.7)	(100.0)			
PD.HD併用週1	235	858	1,093	10	367	1,470
HD(F)	(21.5)	(78.5)	(100.0)			
PD.HD併用週2	41	100	141		31	172
HD(F)	(29.1)	(70.9)	(100.0)			
PD.HD併用週3	8	16	24		5	29
HD(F)	(33.3)	(66.7)	(100.0)			
PD.HD併用週4						
HD(F)						
(%)						
PD.HD併用その他	13	44	57		14	71
(%)	(22.8)	(77.2)	(100.0)			
合計	81,869	166,194	248,063	1,038	64,090	313,191
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			
不明	20	3	23	1	1	25
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
記載なし					1	1
(%)						
総計	81,889	166,197	248,086	1,039	64,092	313,217
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査