

表 1401 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	22 (30.6)	50 (69.4)	72 (100.0)	1	30	103
15歳～ (%)	244 (32.8)	501 (67.2)	745 (100.0)	2	223	970
30歳～ (%)	3,497 (31.7)	7,546 (68.3)	11,043 (100.0)	34	2,779	13,856
45歳～ (%)	13,804 (30.8)	30,986 (69.2)	44,790 (100.0)	165	11,386	56,341
60歳～ (%)	35,105 (31.2)	77,372 (68.8)	112,477 (100.0)	463	28,694	141,634
75歳～ (%)	27,218 (36.5)	47,404 (63.5)	74,622 (100.0)	349	19,777	94,748
90歳～ (%)	1,999 (46.1)	2,337 (53.9)	4,336 (100.0)	25	1,199	5,560
合計 (%)	81,889 (33.0)	166,196 (67.0)	248,085 (100.0)	1,039	64,088	313,212
不明 (%)					4	4
記載なし (%)		1 (100.0)	1 (100.0)			1
総計 (%)	81,889 (33.0)	166,197 (67.0)	248,086 (100.0)	1,039	64,092	313,217
平均	68.75	67.35	67.81	69.18	68.04	67.86
標準偏差	12.77	12.30	12.48	12.34	12.55	12.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査