

表 1402 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	16,233 (29.7)	38,515 (70.3)	54,748 (100.0)	270	14,361	69,379
2年～ (%)	18,973 (30.7)	42,870 (69.3)	61,843 (100.0)	266	16,529	78,638
5年～ (%)	19,423 (31.3)	42,571 (68.7)	61,994 (100.0)	225	15,582	77,801
10年～ (%)	10,716 (33.6)	21,200 (66.4)	31,916 (100.0)	138	8,006	40,060
15年～ (%)	6,606 (38.4)	10,588 (61.6)	17,194 (100.0)	56	4,305	21,555
20年～ (%)	4,161 (43.1)	5,488 (56.9)	9,649 (100.0)	41	2,341	12,031
25年～ (%)	2,594 (48.7)	2,733 (51.3)	5,327 (100.0)	21	1,382	6,730
30年～ (%)	1,736 (55.2)	1,408 (44.8)	3,144 (100.0)	9	764	3,917
35年～ (%)	1,053 (63.1)	616 (36.9)	1,669 (100.0)	9	418	2,096
40年～ (%)	358 (69.8)	155 (30.2)	513 (100.0)		104	617
合計 (%)	81,853 (33.0)	166,144 (67.0)	247,997 (100.0)	1,035	63,792	312,824
不明 (%)	36 (40.9)	52 (59.1)	88 (100.0)	4	300	392
記載なし (%)		1 (100.0)	1 (100.0)			1
総計 (%)	81,889 (33.0)	166,197 (67.0)	248,086 (100.0)	1,039	64,092	313,217
平均	8.57	6.75	7.35	6.83	7.17	7.31
標準偏差	8.67	6.88	7.57	7.43	7.48	7.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査