

表 1425 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

| 年齢           | なし               | あり                | 合計                 | 不明    | 記載なし   | 総計      |
|--------------|------------------|-------------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 15歳未満<br>(%) | 2<br>(22.2)      | 7<br>(77.8)       | 9<br>(100.0)       |       | 1      | 10      |
| 15歳～<br>(%)  | 162<br>(33.2)    | 326<br>(66.8)     | 488<br>(100.0)     | 1     | 88     | 577     |
| 30歳～<br>(%)  | 2,442<br>(31.7)  | 5,250<br>(68.3)   | 7,692<br>(100.0)   | 23    | 1,289  | 9,004   |
| 45歳～<br>(%)  | 9,777<br>(30.4)  | 22,352<br>(69.6)  | 32,129<br>(100.0)  | 122   | 5,319  | 37,570  |
| 60歳～<br>(%)  | 26,392<br>(30.6) | 59,926<br>(69.4)  | 86,318<br>(100.0)  | 379   | 14,245 | 100,942 |
| 75歳～<br>(%)  | 22,028<br>(36.3) | 38,643<br>(63.7)  | 60,671<br>(100.0)  | 301   | 10,593 | 71,565  |
| 90歳～<br>(%)  | 1,624<br>(46.2)  | 1,894<br>(53.8)   | 3,518<br>(100.0)   | 22    | 640    | 4,180   |
| 合計<br>(%)    | 62,427<br>(32.7) | 128,398<br>(67.3) | 190,825<br>(100.0) | 848   | 32,175 | 223,848 |
| 不明<br>(%)    |                  |                   |                    |       | 3      | 3       |
| 記載なし<br>(%)  |                  | 1<br>(100.0)      | 1<br>(100.0)       |       |        | 1       |
| 総計<br>(%)    | 62,427<br>(32.7) | 128,399<br>(67.3) | 190,826<br>(100.0) | 848   | 32,178 | 223,852 |
| 平均           | 69.42            | 67.97             | 68.44              | 69.90 | 68.73  | 68.49   |
| 標準偏差         | 12.62            | 12.09             | 12.28              | 11.97 | 12.33  | 12.29   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査