

表 1456 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
15歳～	47	115	162	1	37	200
(%)	(29.0)	(71.0)	(100.0)			
30歳～	794	1,700	2,494	5	418	2,917
(%)	(31.8)	(68.2)	(100.0)			
45歳～	3,141	6,379	9,520	26	1,660	11,206
(%)	(33.0)	(67.0)	(100.0)			
60歳～	6,606	12,878	19,484	41	3,632	23,157
(%)	(33.9)	(66.1)	(100.0)			
75歳～	3,670	6,021	9,691	22	1,814	11,527
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)			
90歳～	227	241	468	2	103	573
(%)	(48.5)	(51.5)	(100.0)			
合計	14,486	27,334	41,820	97	7,664	49,581
(%)	(34.6)	(65.4)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	14,486	27,334	41,820	97	7,664	49,581
(%)	(34.6)	(65.4)	(100.0)			
平均	66.20	64.97	65.40	65.19	65.80	65.46
標準偏差	12.64	12.40	12.50	13.16	12.43	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査