

表 1457 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	1,640 (30.4)	3,750 (69.6)	5,390 (100.0)	17	998	6,405
2年～ (%)	2,991 (31.8)	6,429 (68.2)	9,420 (100.0)	19	1,630	11,069
5年～ (%)	3,400 (31.5)	7,382 (68.5)	10,782 (100.0)	23	1,969	12,774
10年～ (%)	2,093 (32.8)	4,280 (67.2)	6,373 (100.0)	17	1,173	7,563
15年～ (%)	1,532 (38.7)	2,426 (61.3)	3,958 (100.0)	5	733	4,696
20年～ (%)	1,064 (41.3)	1,513 (58.7)	2,577 (100.0)	5	476	3,058
25年～ (%)	769 (47.8)	841 (52.2)	1,610 (100.0)	3	317	1,930
30年～ (%)	539 (54.1)	457 (45.9)	996 (100.0)	5	196	1,197
35年～ (%)	331 (62.6)	198 (37.4)	529 (100.0)	3	106	638
40年～ (%)	123 (70.3)	52 (29.7)	175 (100.0)		22	197
合計 (%)	14,482 (34.6)	27,328 (65.4)	41,810 (100.0)	97	7,620	49,527
不明 (%)	4 (40.0)	6 (60.0)	10 (100.0)		44	54
記載なし (%)						
総計 (%)	14,486 (34.6)	27,334 (65.4)	41,820 (100.0)	97	7,664	49,581
平均	11.18	8.85	9.65	10.14	9.84	9.68
標準偏差	9.80	7.92	8.69	9.99	8.79	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査