

表 1459 降圧薬使用の有無 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	17	27	44		5	49
(%)	(38.6)	(61.4)	(100.0)			
私立大学	64	78	142	1	32	175
(%)	(45.1)	(54.9)	(100.0)			
国立	16	35	51			51
(%)	(31.4)	(68.6)	(100.0)			
県市町村立	578	1,068	1,646	7	462	2,115
(%)	(35.1)	(64.9)	(100.0)			
社会保険	143	264	407		6	413
(%)	(35.1)	(64.9)	(100.0)			
厚生連	283	546	829	2	191	1,022
(%)	(34.1)	(65.9)	(100.0)			
その他公的	275	466	741	2	111	854
(%)	(37.1)	(62.9)	(100.0)			
私立総合	395	808	1,203	6	33	1,242
(%)	(32.8)	(67.2)	(100.0)			
私立	3,808	6,446	10,254	73	1,927	12,254
(%)	(37.1)	(62.9)	(100.0)			
私立診療所	8,907	17,596	26,503	6	4,897	31,406
(%)	(33.6)	(66.4)	(100.0)			
総計	14,486	27,334	41,820	97	7,664	49,581
(%)	(34.6)	(65.4)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査