

表 1487 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満	18	42	60	1	28	89
(%)	(30.0)	(70.0)	(100.0)			
15歳～	18	48	66		35	101
(%)	(27.3)	(72.7)	(100.0)			
30歳～	91	338	429	5	226	660
(%)	(21.2)	(78.8)	(100.0)			
45歳～	284	1,289	1,573	10	737	2,320
(%)	(18.1)	(81.9)	(100.0)			
60歳～	536	2,092	2,628	16	1,179	3,823
(%)	(20.4)	(79.6)	(100.0)			
75歳～	319	816	1,135	4	510	1,649
(%)	(28.1)	(71.9)	(100.0)			
90歳～	29	53	82		45	127
(%)	(35.4)	(64.6)	(100.0)			
合計	1,295	4,678	5,973	36	2,760	8,769
(%)	(21.7)	(78.3)	(100.0)			
不明						
(%)						
記載なし						
(%)						
総計	1,295	4,678	5,973	36	2,760	8,769
(%)	(21.7)	(78.3)	(100.0)			
平均	64.59	62.50	62.96	59.75	62.50	62.80
標準偏差	15.78	14.06	14.47	14.23	14.80	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査