

表 1488 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	509 (20.2)	2,015 (79.8)	2,524 (100.0)	12	1,144	3,680
2年～ (%)	441 (21.5)	1,612 (78.5)	2,053 (100.0)	15	1,034	3,102
5年～ (%)	239 (22.5)	823 (77.5)	1,062 (100.0)	8	450	1,520
10年～ (%)	68 (29.3)	164 (70.7)	232 (100.0)	1	81	314
15年～ (%)	20 (31.7)	43 (68.3)	63 (100.0)		24	87
20年～ (%)	10 (55.6)	8 (44.4)	18 (100.0)		8	26
25年～ (%)	3 (33.3)	6 (66.7)	9 (100.0)		3	12
30年～ (%)	2 (50.0)	2 (50.0)	4 (100.0)		2	6
35年～ (%)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)			2
40年～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
合計 (%)	1,295 (21.7)	4,674 (78.3)	5,969 (100.0)	36	2,746	8,751
不明 (%)		4 (100.0)	4 (100.0)		14	18
記載なし (%)						
総計 (%)	1,295 (21.7)	4,678 (78.3)	5,973 (100.0)	36	2,760	8,769
平均	3.55	2.92	3.06	3.25	2.85	2.99
標準偏差	4.46	3.42	3.68	2.78	3.27	3.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査