

表 1511 喫煙の有無 治療方法(新分類)別 (透析患者全体)

治療方法 (新分類)	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	154,179	21,513	175,692	12,470	60,563	248,725
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
Off-line HDF	3,354	418	3,772	212	1,348	5,332
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
On-line HDF	27,226	4,317	31,543	1,912	11,072	44,527
(%)	(86.3)	(13.7)	(100.0)			
Push/Pull HDF	67	13	80	2	28	110
(%)	(83.8)	(16.3)	(100.0)			
ハイオフィльтраーション	179	21	200	13	54	267
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
IHDF	2,247	325	2,572	120	848	3,540
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
血液濾過	10		10	2	4	16
(%)	(100.0)		(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル等使用)	968	102	1,070	62	244	1,376
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
在宅血液透析	335	39	374	12	169	555
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	2,635	249	2,884	292	1,726	4,902
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	1,490	187	1,677	159	939	2,775
(%)	(88.8)	(11.2)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	617	77	694	72	326	1,092
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
合計	193,307	27,261	220,568	15,328	77,321	313,217
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	193,307	27,261	220,568	15,328	77,321	313,217
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査