

表 1515 喫煙の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	42,663	5,686	48,349	3,705	17,325	69,379
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
2年～	48,288	6,888	55,176	3,593	19,869	78,638
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
5年～	47,564	7,380	54,944	3,746	19,111	77,801
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
10年～	24,998	3,589	28,587	1,885	9,588	40,060
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
15年～	13,485	1,857	15,342	1,066	5,147	21,555
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
20年～	7,668	960	8,628	622	2,781	12,031
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
25年～	4,259	484	4,743	347	1,640	6,730
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
30年～	2,553	246	2,799	181	937	3,917
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
35年～	1,353	118	1,471	135	490	2,096
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
40年～	404	45	449	39	129	617
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
合計	193,235	27,253	220,488	15,319	77,017	312,824
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
不明	71	8	79	9	304	392
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
記載なし	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	193,307	27,261	220,568	15,328	77,321	313,217
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
平均	7.40	7.11	7.37	7.35	7.15	7.31
標準偏差	7.64	7.05	7.57	7.79	7.45	7.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査