

表 1516 喫煙の有無 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	58,359	7,161	65,520	4,772	23,055	93,347
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	1,922	226	2,148	123	664	2,935
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,596	188	1,784	130	564	2,478
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	1,067	57	1,124	62	359	1,545
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	871	104	975	56	374	1,405
(%)	(89.3)	(10.7)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	7,344	716	8,060	523	2,673	11,256
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
腎硬化症	19,224	2,224	21,448	1,323	7,034	29,805
(%)	(89.6)	(10.4)	(100.0)			
悪性高血圧	1,553	313	1,866	122	630	2,618
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	72,232	12,610	84,842	5,784	29,652	120,278
(%)	(85.1)	(14.9)	(100.0)			
SLE腎炎	1,445	148	1,593	96	538	2,227
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
アミロイド腎	308	23	331	15	116	462
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
痛風腎	671	120	791	40	244	1,075
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	151	26	177	20	77	274
(%)	(85.3)	(14.7)	(100.0)			
腎・尿路結核	127	12	139	4	52	195
(%)	(91.4)	(8.6)	(100.0)			
腎・尿路結石	384	48	432	20	129	581
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	568	80	648	48	214	910
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	449	77	526	37	167	730
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
骨髄腫	179	16	195	13	83	291
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
腎形成不全	422	48	470	29	161	660
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
不明	18,258	2,209	20,467	1,563	7,867	29,897
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
再導入	1,270	234	1,504	136	543	2,183
(%)	(84.4)	(15.6)	(100.0)			
その他	4,893	621	5,514	412	2,118	8,044
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
合計	193,293	27,261	220,554	15,328	77,314	313,196
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			
記載なし	14		14		7	21
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	193,307	27,261	220,568	15,328	77,321	313,217
(%)	(87.6)	(12.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査