

表 1539 喫煙の有無 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	42,628	5,216	47,844	3,639	11,991	63,474
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	1,439	150	1,589	88	363	2,040
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,243	136	1,379	101	291	1,771
(%)	(90.1)	(9.9)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	721	36	757	43	181	981
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	627	66	693	43	193	929
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	5,599	548	6,147	415	1,454	8,016
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
腎硬化症	15,312	1,744	17,056	1,027	3,924	22,007
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
悪性高血圧	1,185	248	1,433	96	332	1,861
(%)	(82.7)	(17.3)	(100.0)			
糖尿病性腎症	57,929	10,006	67,935	4,650	16,841	89,426
(%)	(85.3)	(14.7)	(100.0)			
SLE腎炎	1,052	111	1,163	73	268	1,504
(%)	(90.5)	(9.5)	(100.0)			
アミロイド腎	216	17	233	14	67	314
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
痛風腎	520	94	614	33	131	778
(%)	(84.7)	(15.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	110	20	130	15	28	173
(%)	(84.6)	(15.4)	(100.0)			
腎・尿路結核	97	10	107	4	30	141
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
腎・尿路結石	301	34	335	17	69	421
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	456	66	522	38	118	678
(%)	(87.4)	(12.6)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	333	51	384	30	80	494
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
骨髄腫	131	9	140	7	43	190
(%)	(93.6)	(6.4)	(100.0)			
腎形成不全	273	34	307	16	77	400
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
不明	13,987	1,667	15,654	1,203	4,319	21,176
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
再導入	869	156	1,025	88	243	1,356
(%)	(84.8)	(15.2)	(100.0)			
その他	3,726	464	4,190	315	1,210	5,715
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
合計	148,754	20,883	169,637	11,955	42,253	223,845
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
記載なし	7		7			7
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	148,761	20,883	169,644	11,955	42,253	223,852
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査