

表 1569 喫煙の有無 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	11,773	1,552	13,325	744	3,393	17,462
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	327	51	378	22	84	484
(%)	(86.5)	(13.5)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	238	42	280	19	54	353
(%)	(85.0)	(15.0)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	275	15	290	16	95	401
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	157	30	187	10	64	261
(%)	(84.0)	(16.0)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,302	132	1,434	69	377	1,880
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
腎硬化症	2,563	345	2,908	174	738	3,820
(%)	(88.1)	(11.9)	(100.0)			
悪性高血圧	255	48	303	15	73	391
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	10,635	2,051	12,686	769	3,505	16,960
(%)	(83.8)	(16.2)	(100.0)			
SLE腎炎	297	30	327	17	82	426
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
アミロイド腎	65	2	67		7	74
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
痛風腎	113	22	135	3	28	166
(%)	(83.7)	(16.3)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	26	4	30	2	17	49
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
腎・尿路結核	23	2	25		6	31
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
腎・尿路結石	53	9	62	2	15	79
(%)	(85.5)	(14.5)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	84	10	94	6	19	119
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	65	14	79	4	21	104
(%)	(82.3)	(17.7)	(100.0)			
骨髄腫	20	1	21	4	8	33
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
腎形成不全	92	10	102	9	25	136
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
不明	2,977	427	3,404	217	1,082	4,703
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
再導入	301	66	367	36	80	483
(%)	(82.0)	(18.0)	(100.0)			
その他	755	121	876	62	222	1,160
(%)	(86.2)	(13.8)	(100.0)			
合計	32,396	4,984	37,380	2,200	9,995	49,575
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
記載なし	6		6			6
(%)	(100.0)		(100.0)			
総計	32,402	4,984	37,386	2,200	9,995	49,581
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査