

表 1619 腹膜透析の経験 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	177,830 (96.5)	1,235 (0.7)	5,172 (2.8)	184,237 (100.0)	1,090	63,398	248,725
血液透析濾過 (%)	37,027 (95.2)	239 (0.6)	1,633 (4.2)	38,899 (100.0)	115	14,762	53,776
血液濾過 (%)	11 (100.0)			11 (100.0)		5	16
血液吸着透析 (%)	1,066 (94.7)	5 (0.4)	55 (4.9)	1,126 (100.0)	4	246	1,376
在宅血液透析 (%)	311 (76.0)	20 (4.9)	78 (19.1)	409 (100.0)	6	140	555
腹膜透析 (%)		6,258 (99.0)	62 (1.0)	6,320 (100.0)	7	2,442	8,769
合計 (%)	216,245 (93.6)	7,757 (3.4)	7,000 (3.0)	231,002 (100.0)	1,222	80,993	313,217
記載なし (%)							
総計 (%)	216,245 (93.6)	7,757 (3.4)	7,000 (3.0)	231,002 (100.0)	1,222	80,993	313,217

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査