

表 1620 腹膜透析の経験 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

| 治療方法 (新分類) | なし | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|---------------------|---------|------------------|------------------|---------|-------|--------|---------|
| 施設血液透析 | 177,830 | 1,235 | 5,172 | 184,237 | 1,090 | 63,398 | 248,725 |
| (%) | (96.5) | (0.7) | (2.8) | (100.0) | | | |
| Off-line HDF | 3,708 | 30 | 206 | 3,944 | 15 | 1,373 | 5,332 |
| (%) | (94.0) | (0.8) | (5.2) | (100.0) | | | |
| On-line HDF | 30,571 | 201 | 1,368 | 32,140 | 99 | 12,288 | 44,527 |
| (%) | (95.1) | (0.6) | (4.3) | (100.0) | | | |
| Push/Pull HDF | 78 | | | 78 | | 32 | 110 |
| (%) | (100.0) | | | (100.0) | | | |
| バイオフィルトレーション | 195 | | 7 | 202 | 1 | 64 | 267 |
| (%) | (96.5) | | (3.5) | (100.0) | | | |
| IHDF | 2,475 | 8 | 52 | 2,535 | | 1,005 | 3,540 |
| (%) | (97.6) | (0.3) | (2.1) | (100.0) | | | |
| 血液濾過 | 11 | | | 11 | | 5 | 16 |
| (%) | (100.0) | | | (100.0) | | | |
| 血液吸着透析 (リクセル等使用) | 1,066 | 5 | 55 | 1,126 | 4 | 246 | 1,376 |
| (%) | (94.7) | (0.4) | (4.9) | (100.0) | | | |
| 在宅血液透析 | 311 | 20 | 78 | 409 | 6 | 140 | 555 |
| (%) | (76.0) | (4.9) | (19.1) | (100.0) | | | |
| 腹膜透析 (CAPD) | | 3,418 | 33 | 3,451 | 3 | 1,448 | 4,902 |
| (%) | | (99.0) | (1.0) | (100.0) | | | |
| 腹膜透析 (APD) | | 2,001 | 18 | 2,019 | 4 | 752 | 2,775 |
| (%) | | (99.1) | (0.9) | (100.0) | | | |
| 腹膜透析 (CCPD) | | 839 | 11 | 850 | | 242 | 1,092 |
| (%) | | (98.7) | (1.3) | (100.0) | | | |
| 合計 | 216,245 | 7,757 | 7,000 | 231,002 | 1,222 | 80,993 | 313,217 |
| (%) | (93.6) | (3.4) | (3.0) | (100.0) | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | | |
| 総計 | 216,245 | 7,757 | 7,000 | 231,002 | 1,222 | 80,993 | 313,217 |
| (%) | (93.6) | (3.4) | (3.0) | (100.0) | | | |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査