

表 1621 腹膜透析の経験 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	216,218 (96.3)	1,296 (0.6)	6,927 (3.1)	224,441 (100.0)	1,214	78,508	304,163
PD単独 (%)		4,919 (99.2)	41 (0.8)	4,960 (100.0)	5	2,139	7,104
HD(F)単独.PDカテーテルあり (%)	14 (8.8)	136 (85.5)	9 (5.7)	159 (100.0)		23	182
PD.HD併用週1 HD(F) (%)		1,176 (98.7)	16 (1.3)	1,192 (100.0)	2	276	1,470
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		145 (98.0)	3 (2.0)	148 (100.0)		24	172
PD.HD併用週3 HD(F) (%)		27 (100.0)		27 (100.0)		2	29
PD.HD併用週4 HD(F) (%)							
PD.HD併用その他 (%)		58 (96.7)	2 (3.3)	60 (100.0)		11	71
合計 (%)	216,232 (93.6)	7,757 (3.4)	6,998 (3.0)	230,987 (100.0)	1,221	80,983	313,191
不明 (%)	13 (86.7)		2 (13.3)	15 (100.0)	1	9	25
記載なし (%)						1	1
総計 (%)	216,245 (93.6)	7,757 (3.4)	7,000 (3.0)	231,002 (100.0)	1,222	80,993	313,217

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査