

表 1625 腹膜透析の経験 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	62,972	2,651	3,410	69,033	385	23,929	93,347
(%)	(91.2)	(3.8)	(4.9)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	2,024	102	108	2,234	20	681	2,935
(%)	(90.6)	(4.6)	(4.8)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,766	54	47	1,867	5	606	2,478
(%)	(94.6)	(2.9)	(2.5)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	1,053	38	66	1,157	6	382	1,545
(%)	(91.0)	(3.3)	(5.7)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	914	72	43	1,029	4	372	1,405
(%)	(88.8)	(7.0)	(4.2)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	7,982	226	177	8,385	32	2,839	11,256
(%)	(95.2)	(2.7)	(2.1)	(100.0)			
腎硬化症	21,026	909	482	22,417	76	7,312	29,805
(%)	(93.8)	(4.1)	(2.2)	(100.0)			
悪性高血圧	1,782	79	62	1,923	14	681	2,618
(%)	(92.7)	(4.1)	(3.2)	(100.0)			
糖尿病性腎症	84,675	2,379	1,543	88,597	402	31,279	120,278
(%)	(95.6)	(2.7)	(1.7)	(100.0)			
SLE腎炎	1,572	41	58	1,671	8	548	2,227
(%)	(94.1)	(2.5)	(3.5)	(100.0)			
アミロイド腎	322	9	9	340		122	462
(%)	(94.7)	(2.6)	(2.6)	(100.0)			
痛風腎	752	35	30	817	3	255	1,075
(%)	(92.0)	(4.3)	(3.7)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	167	11	17	195	1	78	274
(%)	(85.6)	(5.6)	(8.7)	(100.0)			
腎・尿路結核	142		4	146		49	195
(%)	(97.3)		(2.7)	(100.0)			
腎・尿路結石	421	16	9	446		135	581
(%)	(94.4)	(3.6)	(2.0)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	658	16	9	683	1	226	910
(%)	(96.3)	(2.3)	(1.3)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	513	19	22	554	1	175	730
(%)	(92.6)	(3.4)	(4.0)	(100.0)			
骨髄腫	213	7	1	221		70	291
(%)	(96.4)	(3.2)	(0.5)	(100.0)			
腎形成不全	387	60	53	500		160	660
(%)	(77.4)	(12.0)	(10.6)	(100.0)			
不明	20,146	724	582	21,452	224	8,221	29,897
(%)	(93.9)	(3.4)	(2.7)	(100.0)			
再導入	1,505	79	102	1,686	6	491	2,183
(%)	(89.3)	(4.7)	(6.0)	(100.0)			
その他	5,240	230	165	5,635	34	2,375	8,044
(%)	(93.0)	(4.1)	(2.9)	(100.0)			
合計	216,232	7,757	6,999	230,988	1,222	80,986	313,196
(%)	(93.6)	(3.4)	(3.0)	(100.0)			
記載なし	13		1	14		7	21
(%)	(92.9)		(7.1)	(100.0)			
総計	216,245	7,757	7,000	231,002	1,222	80,993	313,217
(%)	(93.6)	(3.4)	(3.0)	(100.0)			

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査