

表 1645 腹膜透析の経験 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 年齢 | なし | あり(年末時点でカテーテルあり) | あり(年末時点でカテーテルなし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------|---------|------------------|------------------|---------|-------|--------|---------|
| 15歳未満 | 4 | | 3 | 7 | | 3 | 10 |
| (%) | (57.1) | | (42.9) | (100.0) | | | |
| 15歳～ | 396 | 12 | 49 | 457 | 1 | 119 | 577 |
| (%) | (86.7) | (2.6) | (10.7) | (100.0) | | | |
| 30歳～ | 6,780 | 91 | 383 | 7,254 | 39 | 1,711 | 9,004 |
| (%) | (93.5) | (1.3) | (5.3) | (100.0) | | | |
| 45歳～ | 28,356 | 289 | 1,250 | 29,895 | 184 | 7,491 | 37,570 |
| (%) | (94.9) | (1.0) | (4.2) | (100.0) | | | |
| 60歳～ | 77,034 | 560 | 2,543 | 80,137 | 437 | 20,368 | 100,942 |
| (%) | (96.1) | (0.7) | (3.2) | (100.0) | | | |
| 75歳～ | 55,716 | 190 | 743 | 56,649 | 346 | 14,570 | 71,565 |
| (%) | (98.4) | (0.3) | (1.3) | (100.0) | | | |
| 90歳～ | 3,323 | 7 | 21 | 3,351 | 24 | 805 | 4,180 |
| (%) | (99.2) | (0.2) | (0.6) | (100.0) | | | |
| 合計 | 171,609 | 1,149 | 4,992 | 177,750 | 1,031 | 45,067 | 223,848 |
| (%) | (96.5) | (0.6) | (2.8) | (100.0) | | | |
| 不明 | 1 | | | 1 | | 2 | 3 |
| (%) | (100.0) | | | (100.0) | | | |
| 記載なし | 1 | | | 1 | | | 1 |
| (%) | (100.0) | | | (100.0) | | | |
| 総計 | 171,611 | 1,149 | 4,992 | 177,752 | 1,031 | 45,069 | 223,852 |
| (%) | (96.5) | (0.6) | (2.8) | (100.0) | | | |
| 平均 | 68.65 | 63.01 | 62.69 | 68.45 | 68.74 | 68.63 | 68.49 |
| 標準偏差 | 12.27 | 12.68 | 12.30 | 12.32 | 12.43 | 12.17 | 12.29 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査