

表 1646 腹膜透析の経験 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	39,822 (98.5)	202 (0.5)	391 (1.0)	40,415 (100.0)	239	10,216	50,870
2年～ (%)	43,789 (97.7)	227 (0.5)	811 (1.8)	44,827 (100.0)	252	11,776	56,855
5年～ (%)	43,270 (95.8)	344 (0.8)	1,541 (3.4)	45,155 (100.0)	250	11,418	56,823
10年～ (%)	21,912 (95.0)	176 (0.8)	985 (4.3)	23,073 (100.0)	145	5,675	28,893
15年～ (%)	11,241 (94.0)	93 (0.8)	620 (5.2)	11,954 (100.0)	61	2,927	14,942
20年～ (%)	5,852 (92.8)	63 (1.0)	390 (6.2)	6,305 (100.0)	42	1,431	7,778
25年～ (%)	3,006 (94.8)	22 (0.7)	142 (4.5)	3,170 (100.0)	30	784	3,984
30年～ (%)	1,637 (95.1)	14 (0.8)	70 (4.1)	1,721 (100.0)	8	385	2,114
35年～ (%)	823 (96.8)	4 (0.5)	23 (2.7)	850 (100.0)	2	218	1,070
40年～ (%)	209 (90.5)	4 (1.7)	18 (7.8)	231 (100.0)	1	53	285
合計 (%)	171,561 (96.5)	1,149 (0.6)	4,991 (2.8)	177,701 (100.0)	1,030	44,883	223,614
不明 (%)	49 (98.0)		1 (2.0)	50 (100.0)	1	186	237
記載なし (%)	1 (100.0)			1 (100.0)			1
総計 (%)	171,611 (96.5)	1,149 (0.6)	4,992 (2.8)	177,752 (100.0)	1,031	45,069	223,852
平均	6.89	8.23	10.34	6.99	7.21	6.82	6.96
標準偏差	7.09	7.52	7.62	7.13	7.24	6.99	7.10

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査