

表 1647 腹膜透析の経験 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	47,757 (94.5)	441 (0.9)	2,339 (4.6)	50,537 (100.0)	308	12,629	63,474
慢性腎盂腎炎 (%)	1,552 (94.2)	16 (1.0)	79 (4.8)	1,647 (100.0)	18	375	2,040
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,416 (97.5)	4 (0.3)	32 (2.2)	1,452 (100.0)	4	315	1,771
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	724 (93.2)	6 (0.8)	47 (6.0)	777 (100.0)	5	199	981
その他の分類不能の腎炎 (%)	702 (95.9)	9 (1.2)	21 (2.9)	732 (100.0)	4	193	929
多発性嚢胞腎 (%)	6,296 (97.6)	32 (0.5)	123 (1.9)	6,451 (100.0)	28	1,537	8,016
腎硬化症 (%)	17,329 (97.3)	93 (0.5)	379 (2.1)	17,801 (100.0)	70	4,136	22,007
悪性高血圧 (%)	1,410 (96.3)	8 (0.5)	46 (3.1)	1,464 (100.0)	12	385	1,861
糖尿病性腎症 (%)	69,398 (97.8)	344 (0.5)	1,194 (1.7)	70,936 (100.0)	345	18,145	89,426
SLE腎炎 (%)	1,176 (96.2)	9 (0.7)	37 (3.0)	1,222 (100.0)	6	276	1,504
アミロイド腎 (%)	240 (97.2)		7 (2.8)	247 (100.0)		67	314
痛風腎 (%)	609 (96.1)	5 (0.8)	20 (3.2)	634 (100.0)	3	141	778
先天性代謝異常による腎不全 (%)	131 (91.6)		12 (8.4)	143 (100.0)	1	29	173
腎・尿路結核 (%)	110 (98.2)		2 (1.8)	112 (100.0)		29	141
腎・尿路結石 (%)	337 (97.4)		9 (2.6)	346 (100.0)		75	421
腎・尿路腫瘍 (%)	552 (98.7)	2 (0.4)	5 (0.9)	559 (100.0)	1	118	678
閉塞性尿路障害 (%)	395 (96.6)	2 (0.5)	12 (2.9)	409 (100.0)	1	84	494
骨髄腫 (%)	154 (100.0)			154 (100.0)		36	190
腎形成不全 (%)	290 (86.6)	9 (2.7)	36 (10.7)	335 (100.0)		65	400
不明 (%)	15,808 (96.9)	104 (0.6)	408 (2.5)	16,320 (100.0)	196	4,660	21,176
再導入 (%)	1,064 (92.2)	24 (2.1)	66 (5.7)	1,154 (100.0)	2	200	1,356
その他 (%)	4,154 (96.3)	41 (1.0)	118 (2.7)	4,313 (100.0)	27	1,375	5,715
合計 (%)	171,604 (96.5)	1,149 (0.6)	4,992 (2.8)	177,745 (100.0)	1,031	45,069	223,845
記載なし (%)	7 (100.0)			7 (100.0)			7
総計 (%)	171,611 (96.5)	1,149 (0.6)	4,992 (2.8)	177,752 (100.0)	1,031	45,069	223,852

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査