

表 1675 腹膜透析の経験 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	4,845 (98.5)	18 (0.4)	54 (1.1)	4,917 (100.0)	8	1,480	6,405
2年～ (%)	8,233 (97.5)	32 (0.4)	175 (2.1)	8,440 (100.0)	25	2,604	11,069
5年～ (%)	9,396 (95.4)	62 (0.6)	395 (4.0)	9,853 (100.0)	25	2,896	12,774
10年～ (%)	5,467 (93.2)	45 (0.8)	355 (6.1)	5,867 (100.0)	15	1,681	7,563
15年～ (%)	3,334 (92.3)	31 (0.9)	249 (6.9)	3,614 (100.0)	14	1,068	4,696
20年～ (%)	2,194 (91.8)	17 (0.7)	178 (7.5)	2,389 (100.0)	10	659	3,058
25年～ (%)	1,342 (92.0)	8 (0.5)	108 (7.4)	1,458 (100.0)	9	463	1,930
30年～ (%)	845 (95.6)	2 (0.2)	37 (4.2)	884 (100.0)	1	312	1,197
35年～ (%)	451 (94.4)	4 (0.8)	23 (4.8)	478 (100.0)	6	154	638
40年～ (%)	136 (88.3)	3 (1.9)	15 (9.7)	154 (100.0)	1	42	197
合計 (%)	36,243 (95.2)	222 (0.6)	1,589 (4.2)	38,054 (100.0)	114	11,359	49,527
不明 (%)	6 (85.7)		1 (14.3)	7 (100.0)		47	54
記載なし (%)							
総計 (%)	36,249 (95.2)	222 (0.6)	1,590 (4.2)	38,061 (100.0)	114	11,406	49,581
平均	9.50	11.33	13.32	9.67	12.47	9.71	9.68
標準偏差	8.63	8.72	8.63	8.67	10.47	8.82	8.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査