

表 1676 腹膜透析の経験 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	12,591 (92.8)	97 (0.7)	879 (6.5)	13,567 (100.0)	55	3,840	17,462
慢性腎盂腎炎 (%)	360 (94.0)	3 (0.8)	20 (5.2)	383 (100.0)	1	100	484
急速進行性糸球体腎炎 (%)	258 (94.5)	2 (0.7)	13 (4.8)	273 (100.0)	1	79	353
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	283 (95.0)	3 (1.0)	12 (4.0)	298 (100.0)	1	102	401
その他の分類不能の腎炎 (%)	171 (89.1)	2 (1.0)	19 (9.9)	192 (100.0)		69	261
多発性嚢胞腎 (%)	1,342 (96.4)	7 (0.5)	43 (3.1)	1,392 (100.0)	3	485	1,880
腎硬化症 (%)	2,851 (96.8)	15 (0.5)	79 (2.7)	2,945 (100.0)	6	869	3,820
悪性高血圧 (%)	294 (95.5)	1 (0.3)	13 (4.2)	308 (100.0)	2	81	391
糖尿病性腎症 (%)	12,686 (97.6)	55 (0.4)	260 (2.0)	13,001 (100.0)	33	3,926	16,960
SLE腎炎 (%)	324 (95.0)	1 (0.3)	16 (4.7)	341 (100.0)	1	84	426
アミロイド腎 (%)	62 (96.9)		2 (3.1)	64 (100.0)		10	74
痛風腎 (%)	121 (93.1)	2 (1.5)	7 (5.4)	130 (100.0)		36	166
先天性代謝異常による腎不全 (%)	29 (87.9)		4 (12.1)	33 (100.0)		16	49
腎・尿路結核 (%)	25 (96.2)		1 (3.8)	26 (100.0)		5	31
腎・尿路結石 (%)	63 (100.0)			63 (100.0)		16	79
腎・尿路腫瘍 (%)	82 (94.3)	3 (3.4)	2 (2.3)	87 (100.0)		32	119
閉塞性尿路障害 (%)	68 (90.7)	1 (1.3)	6 (8.0)	75 (100.0)		29	104
骨髄腫 (%)	23 (95.8)		1 (4.2)	24 (100.0)		9	33
腎形成不全 (%)	85 (83.3)	2 (2.0)	15 (14.7)	102 (100.0)		34	136
不明 (%)	3,380 (95.8)	15 (0.4)	133 (3.8)	3,528 (100.0)	5	1,170	4,703
再導入 (%)	355 (90.1)	10 (2.5)	29 (7.4)	394 (100.0)	1	88	483
その他 (%)	790 (95.3)	3 (0.4)	36 (4.3)	829 (100.0)	5	326	1,160
合計 (%)	36,243 (95.2)	222 (0.6)	1,590 (4.2)	38,055 (100.0)	114	11,406	49,575
記載なし (%)	6 (100.0)			6 (100.0)			6
総計 (%)	36,249 (95.2)	222 (0.6)	1,590 (4.2)	38,061 (100.0)	114	11,406	49,581

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査