

表 1822 透析時間(時間/回) 性別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

性別	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	252	13,700	10,199	99,209	7,971	10,665	406	772	28	410	143,612	828	144,440	4.01	0.53
(%)	(0.2)	(9.5)	(7.1)	(69.1)	(5.6)	(7.4)	(0.3)	(0.5)	(0.0)	(0.3)	(100.0)				
女性	209	10,099	7,024	53,205	3,283	4,403	173	328	16	140	78,880	532	79,412	3.93	0.52
(%)	(0.3)	(12.8)	(8.9)	(67.5)	(4.2)	(5.6)	(0.2)	(0.4)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				
合計	461	23,799	17,223	152,414	11,254	15,068	579	1,100	44	550	222,492	1,360	223,852	3.98	0.52
(%)	(0.2)	(10.7)	(7.7)	(68.5)	(5.1)	(6.8)	(0.3)	(0.5)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	461	23,799	17,223	152,414	11,254	15,068	579	1,100	44	550	222,492	1,360	223,852	3.98	0.52
(%)	(0.2)	(10.7)	(7.7)	(68.5)	(5.1)	(6.8)	(0.3)	(0.5)	(0.0)	(0.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査