

表 1823 透析時間(時間/回) 年齢(歳)別(施設血液透析患者 透析回数週3回)

| 年齢           | 3.0未満        | 3.0～             | 3.5～            | 4.0～              | 4.5～            | 5.0～            | 5.5～         | 6.0～           | 6.5～        | 7.0～         | 合計                 | 記載なし  | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------------|-------|---------|------|------|
| 15歳未満<br>(%) |              | 2<br>(20.0)      |                 | 7<br>(70.0)       |                 | 1<br>(10.0)     |              |                |             |              | 10<br>(100.0)      |       | 10      | 3.90 | 0.57 |
| 15歳～<br>(%)  |              | 52<br>(9.0)      | 37<br>(6.4)     | 373<br>(64.9)     | 45<br>(7.8)     | 57<br>(9.9)     | 2<br>(0.3)   | 4<br>(0.7)     |             | 5<br>(0.9)   | 575<br>(100.0)     | 2     | 577     | 4.08 | 0.63 |
| 30歳～<br>(%)  | 10<br>(0.1)  | 533<br>(6.0)     | 413<br>(4.6)    | 5,851<br>(65.4)   | 746<br>(8.3)    | 1,165<br>(13.0) | 48<br>(0.5)  | 82<br>(0.9)    | 7<br>(0.1)  | 93<br>(1.0)  | 8,948<br>(100.0)   | 56    | 9,004   | 4.17 | 0.64 |
| 45歳～<br>(%)  | 46<br>(0.1)  | 2,308<br>(6.2)   | 1,957<br>(5.2)  | 25,421<br>(68.0)  | 2,941<br>(7.9)  | 3,993<br>(10.7) | 179<br>(0.5) | 294<br>(0.8)   | 12<br>(0.0) | 222<br>(0.6) | 37,373<br>(100.0)  | 197   | 37,570  | 4.11 | 0.57 |
| 60歳～<br>(%)  | 139<br>(0.1) | 8,682<br>(8.7)   | 7,056<br>(7.0)  | 71,166<br>(70.9)  | 5,315<br>(5.3)  | 7,025<br>(7.0)  | 261<br>(0.3) | 508<br>(0.5)   | 19<br>(0.0) | 173<br>(0.2) | 100,344<br>(100.0) | 598   | 100,942 | 4.00 | 0.49 |
| 75歳～<br>(%)  | 226<br>(0.3) | 11,145<br>(15.7) | 7,207<br>(10.1) | 47,341<br>(66.6)  | 2,114<br>(3.0)  | 2,718<br>(3.8)  | 85<br>(0.1)  | 202<br>(0.3)   | 6<br>(0.0)  | 53<br>(0.1)  | 71,097<br>(100.0)  | 468   | 71,565  | 3.86 | 0.49 |
| 90歳～<br>(%)  | 40<br>(1.0)  | 1,076<br>(26.0)  | 553<br>(13.4)   | 2,253<br>(54.4)   | 93<br>(2.2)     | 109<br>(2.6)    | 4<br>(0.1)   | 10<br>(0.2)    |             | 4<br>(0.1)   | 4,142<br>(100.0)   | 38    | 4,180   | 3.72 | 0.54 |
| 合計<br>(%)    | 461<br>(0.2) | 23,798<br>(10.7) | 17,223<br>(7.7) | 152,412<br>(68.5) | 11,254<br>(5.1) | 15,068<br>(6.8) | 579<br>(0.3) | 1,100<br>(0.5) | 44<br>(0.0) | 550<br>(0.2) | 222,489<br>(100.0) | 1,359 | 223,848 | 3.98 | 0.52 |
| 不明<br>(%)    |              |                  |                 | 2<br>(100.0)      |                 |                 |              |                |             |              | 2<br>(100.0)       | 1     | 3       | 4.00 |      |
| 記載なし<br>(%)  |              | 1<br>(100.0)     |                 |                   |                 |                 |              |                |             |              | 1<br>(100.0)       |       | 1       | 3.00 |      |
| 総計<br>(%)    | 461<br>(0.2) | 23,799<br>(10.7) | 17,223<br>(7.7) | 152,414<br>(68.5) | 11,254<br>(5.1) | 15,068<br>(6.8) | 579<br>(0.3) | 1,100<br>(0.5) | 44<br>(0.0) | 550<br>(0.2) | 222,492<br>(100.0) | 1,360 | 223,852 | 3.98 | 0.52 |
| 平均           | 74.90        | 73.20            | 71.72           | 68.30             | 63.92           | 63.38           | 62.20        | 63.50          | 59.82       | 56.89        | 68.48              | 69.72 | 68.49   |      |      |
| 標準偏差         | 12.27        | 11.91            | 11.76           | 11.99             | 12.23           | 12.49           | 12.29        | 12.36          | 12.93       | 13.09        | 12.29              | 12.39 | 12.29   |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査