

表 1849 透析時間(時間/回) 性別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

性別	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	50	1,695	1,825	21,119	3,032	3,343	139	226	7	28	31,464	166	31,630	4.11	0.50
(%)	(0.2)	(5.4)	(5.8)	(67.1)	(9.6)	(10.6)	(0.4)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
女性	30	1,284	1,335	12,224	1,335	1,456	75	97	10	5	17,851	100	17,951	4.04	0.48
(%)	(0.2)	(7.2)	(7.5)	(68.5)	(7.5)	(8.2)	(0.4)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(100.0)				
合計	80	2,979	3,160	33,343	4,367	4,799	214	323	17	33	49,315	266	49,581	4.09	0.49
(%)	(0.2)	(6.0)	(6.4)	(67.6)	(8.9)	(9.7)	(0.4)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	80	2,979	3,160	33,343	4,367	4,799	214	323	17	33	49,315	266	49,581	4.09	0.49
(%)	(0.2)	(6.0)	(6.4)	(67.6)	(8.9)	(9.7)	(0.4)	(0.7)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査