

表 1852 透析時間(時間/回) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	26 (0.1)	729 (4.2)	884 (5.1)	11,367 (65.5)	1,921 (11.1)	2,132 (12.3)	115 (0.7)	146 (0.8)	13 (0.1)	15 (0.1)	17,348 (100.0)	114	17,462	4.16	0.50
慢性腎盂腎炎 （％）		17 (3.5)	33 (6.9)	344 (71.8)	32 (6.7)	46 (9.6)	3 (0.6)	4 (0.8)			479 (100.0)	5	484	4.10	0.46
急速進行性糸球 体腎炎 （％）		28 (8.0)	28 (8.0)	239 (68.3)	29 (8.3)	25 (7.1)		1 (0.3)			350 (100.0)	3	353	4.02	0.45
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		6 (1.5)	21 (5.3)	280 (70.4)	45 (11.3)	39 (9.8)	2 (0.5)	4 (1.0)	1 (0.3)		398 (100.0)	3	401	4.16	0.45
その他の分類不 能の腎炎 （％）	3 (1.2)	12 (4.7)	23 (8.9)	152 (58.9)	35 (13.6)	27 (10.5)	1 (0.4)	5 (1.9)			258 (100.0)	3	261	4.14	0.53
多発性嚢胞腎 （％）	1 (0.1)	98 (5.2)	104 (5.6)	1,299 (69.4)	200 (10.7)	153 (8.2)	5 (0.3)	12 (0.6)	1 (0.1)		1,873 (100.0)	7	1,880	4.10	0.45
腎硬化症 （％）	15 (0.4)	339 (8.9)	323 (8.5)	2,622 (68.9)	232 (6.1)	254 (6.7)	5 (0.1)	11 (0.3)		3 (0.1)	3,804 (100.0)	16	3,820	3.99	0.48
悪性高血圧 （％）		24 (6.1)	29 (7.4)	250 (63.9)	39 (10.0)	47 (12.0)	1 (0.3)	1 (0.3)			391 (100.0)		391	4.09	0.48
糖尿病性腎症 （％）	19 (0.1)	1,204 (7.1)	1,177 (7.0)	11,634 (68.9)	1,271 (7.5)	1,439 (8.5)	42 (0.2)	83 (0.5)		7 (0.0)	16,876 (100.0)	84	16,960	4.05	0.48
SLE腎炎 （％）	1 (0.2)	15 (3.5)	34 (8.0)	298 (70.0)	31 (7.3)	38 (8.9)	3 (0.7)	4 (0.9)	1 (0.2)	1 (0.2)	426 (100.0)		426	4.11	0.49
アミロイド腎 （％）		10 (13.9)	7 (9.7)	47 (65.3)	6 (8.3)	2 (2.8)					72 (100.0)	2	74	3.90	0.45
痛風腎 （％）	1 (0.6)	5 (3.0)	10 (6.1)	117 (70.9)	15 (9.1)	16 (9.7)		1 (0.6)			165 (100.0)	1	166	4.09	0.44
先天性代謝異常 による腎不全 （％）		2 (4.1)	2 (4.1)	31 (63.3)	5 (10.2)	8 (16.3)	1 (2.0)				49 (100.0)		49	4.20	0.51
腎・尿路結核 （％）			3 (9.7)	20 (64.5)	5 (16.1)	3 (9.7)					31 (100.0)		31	4.14	0.39
腎・尿路結石 （％）		7 (9.0)	6 (7.7)	54 (69.2)	8 (10.3)	3 (3.8)					78 (100.0)	1	79	3.97	0.42
腎・尿路腫瘍 （％）	1 (0.8)	12 (10.1)	9 (7.6)	74 (62.2)	6 (5.0)	15 (12.6)		2 (1.7)			119 (100.0)		119	4.04	0.59
閉塞性尿路障害 （％）	1 (1.0)	5 (4.9)	10 (9.7)	73 (70.9)	5 (4.9)	9 (8.7)					103 (100.0)	1	104	4.02	0.44
骨髄腫 （％）		5 (15.2)	2 (6.1)	24 (72.7)		1 (3.0)	1 (3.0)				33 (100.0)		33	3.91	0.50
腎形成不全 （％）	1 (0.7)	3 (2.2)	5 (3.7)	93 (68.4)	14 (10.3)	18 (13.2)	1 (0.7)	1 (0.7)			136 (100.0)		136	4.18	0.49
不明 （％）	10 (0.2)	367 (7.8)	351 (7.5)	3,210 (68.4)	331 (7.1)	356 (7.6)	25 (0.5)	32 (0.7)	1 (0.0)	7 (0.1)	4,690 (100.0)	13	4,703	4.04	0.50
再導入 （％）		16 (3.3)	20 (4.2)	320 (66.5)	54 (11.2)	62 (12.9)	3 (0.6)	6 (1.2)			481 (100.0)	2	483	4.18	0.49
その他 （％）	1 (0.1)	75 (6.5)	78 (6.8)	791 (68.8)	82 (7.1)	106 (9.2)	6 (0.5)	10 (0.9)			1,149 (100.0)	11	1,160	4.07	0.49
合計 （％）	80 (0.2)	2,979 (6.0)	3,159 (6.4)	33,339 (67.6)	4,366 (8.9)	4,799 (9.7)	214 (0.4)	323 (0.7)	17 (0.0)	33 (0.1)	49,309 (100.0)	266	49,575	4.09	0.49
記載なし （％）			1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)						6 (100.0)		6	4.00	0.32
総計 （％）	80 (0.2)	2,979 (6.0)	3,160 (6.4)	33,343 (67.6)	4,367 (8.9)	4,799 (9.7)	214 (0.4)	323 (0.7)	17 (0.0)	33 (0.1)	49,315 (100.0)	266	49,581	4.09	0.49

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査