

表 1902 血流量(ml/分) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性		25	34	627	221	1,413	9,122	5,470	9,025	1,040	1,167	2,607	397	193	31,341	289	31,630	232.91	40.43
(%)		(0.1)	(0.1)	(2.0)	(0.7)	(4.5)	(29.1)	(17.5)	(28.8)	(3.3)	(3.7)	(8.3)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
女性		28	77	1,026	389	2,042	7,298	2,761	2,965	233	326	485	66	47	17,743	208	17,951	211.86	36.43
(%)		(0.2)	(0.4)	(5.8)	(2.2)	(11.5)	(41.1)	(15.6)	(16.7)	(1.3)	(1.8)	(2.7)	(0.4)	(0.3)	(100.0)				
合計		53	111	1,653	610	3,455	16,420	8,231	11,990	1,273	1,493	3,092	463	240	49,084	497	49,581	225.30	40.32
(%)		(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.2)	(7.0)	(33.5)	(16.8)	(24.4)	(2.6)	(3.0)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計		53	111	1,653	610	3,455	16,420	8,231	11,990	1,273	1,493	3,092	463	240	49,084	497	49,581	225.30	40.32
(%)		(0.1)	(0.2)	(3.4)	(1.2)	(7.0)	(33.5)	(16.8)	(24.4)	(2.6)	(3.0)	(6.3)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査