

表 1903 血流量(ml/分) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)							1 (100.0)								1 (100.0)		1	200.00	
15歳～ (%)		1 (0.5)		6 (3.1)	4 (2.0)	9 (4.6)	53 (27.0)	33 (16.8)	57 (29.1)	6 (3.1)	3 (1.5)	18 (9.2)	3 (1.5)	3 (1.5)	196 (100.0)	4	200	233.04	47.64
30歳～ (%)		2 (0.1)	3 (0.1)	28 (1.0)	6 (0.2)	80 (2.8)	570 (19.7)	506 (17.5)	949 (32.8)	133 (4.6)	156 (5.4)	371 (12.8)	60 (2.1)	27 (0.9)	2,891 (100.0)	26	2,917	244.84	42.60
45歳～ (%)		6 (0.1)	13 (0.1)	111 (1.0)	50 (0.5)	417 (3.8)	2,697 (24.3)	1,988 (17.9)	3,481 (31.3)	419 (3.8)	484 (4.4)	1,168 (10.5)	190 (1.7)	80 (0.7)	11,104 (100.0)	102	11,206	239.08	41.14
60歳～ (%)		23 (0.1)	31 (0.1)	562 (2.5)	239 (1.0)	1,485 (6.5)	8,064 (35.2)	4,127 (18.0)	5,683 (24.8)	550 (2.4)	689 (3.0)	1,204 (5.3)	169 (0.7)	102 (0.4)	22,928 (100.0)	229	23,157	224.86	37.90
75歳～ (%)		17 (0.1)	62 (0.5)	845 (7.4)	285 (2.5)	1,355 (11.9)	4,812 (42.2)	1,537 (13.5)	1,782 (15.6)	161 (1.4)	158 (1.4)	325 (2.8)	37 (0.3)	28 (0.2)	11,404 (100.0)	123	11,527	209.29	36.23
90歳～ (%)		4 (0.7)	2 (0.4)	101 (18.0)	26 (4.6)	109 (19.5)	223 (39.8)	40 (7.1)	38 (6.8)	4 (0.7)	3 (0.5)	6 (1.1)	4 (0.7)		560 (100.0)	13	573	192.55	34.23
合計 (%)		53 (0.1)	111 (0.2)	1,653 (3.4)	610 (1.2)	3,455 (7.0)	16,420 (33.5)	8,231 (16.8)	11,990 (24.4)	1,273 (2.6)	1,493 (3.0)	3,092 (6.3)	463 (0.9)	240 (0.5)	49,084 (100.0)	497	49,581	225.30	40.32
不明 (%)																			
記載なし (%)																			
総計 (%)		53 (0.1)	111 (0.2)	1,653 (3.4)	610 (1.2)	3,455 (7.0)	16,420 (33.5)	8,231 (16.8)	11,990 (24.4)	1,273 (2.6)	1,493 (3.0)	3,092 (6.3)	463 (0.9)	240 (0.5)	49,084 (100.0)	497	49,581	225.30	40.32
平均		69.58	73.95	74.90	73.40	71.21	68.16	64.22	62.29	60.67	60.34	59.09	57.96	59.83	65.45	66.51	65.46		
標準偏差		14.49	12.29	11.60	11.49	11.68	11.62	11.82	12.02	12.21	11.81	12.07	12.30	12.65	12.48	13.11	12.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査