

表 1905 血流量(ml/分) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		21 (0.1)	28 (0.2)	404 (2.3)	195 (1.1)	1,075 (6.2)	5,553 (32.2)	3,115 (18.0)	4,467 (25.9)	475 (2.8)	568 (3.3)	1,114 (6.5)	150 (0.9)	102 (0.6)	17,267 (100.0)	195	17,462	227.75	40.13
慢性腎盂腎炎 (%)			1 (0.2)	15 (3.1)	3 (0.6)	53 (11.1)	147 (30.8)	86 (18.0)	115 (24.1)	15 (3.1)	18 (3.8)	20 (4.2)	3 (0.6)	2 (0.4)	478 (100.0)	6	484	223.27	39.16
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				13 (3.7)	1 (0.3)	26 (7.4)	130 (37.2)	53 (15.2)	77 (22.1)	6 (1.7)	15 (4.3)	24 (6.9)	3 (0.9)	1 (0.3)	349 (100.0)	4	353	224.54	40.85
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)				15 (3.8)	3 (0.8)	49 (12.4)	143 (36.3)	74 (18.8)	72 (18.3)	8 (2.0)	14 (3.6)	16 (4.1)			394 (100.0)	7	401	216.70	33.80
その他の分類不 能の腎炎 (%)				10 (3.9)	3 (1.2)	18 (7.0)	72 (28.1)	42 (16.4)	57 (22.3)	9 (3.5)	10 (3.9)	30 (11.7)	5 (2.0)		256 (100.0)	5	261	231.68	43.04
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	51 (2.7)	19 (1.0)	107 (5.7)	591 (31.7)	326 (17.5)	488 (26.2)	61 (3.3)	64 (3.4)	125 (6.7)	17 (0.9)	14 (0.8)	1,865 (100.0)	15	1,880	228.72	40.12
腎硬化症 (%)		2 (0.1)	11 (0.3)	213 (5.6)	74 (2.0)	348 (9.2)	1,327 (35.2)	553 (14.7)	805 (21.4)	102 (2.7)	69 (1.8)	211 (5.6)	38 (1.0)	17 (0.5)	3,770 (100.0)	50	3,820	219.66	41.01
悪性高血圧 (%)				9 (2.3)	7 (1.8)	18 (4.6)	107 (27.4)	67 (17.1)	120 (30.7)	8 (2.0)	11 (2.8)	38 (9.7)	3 (0.8)	3 (0.8)	391 (100.0)		391	232.94	41.91
糖尿病性腎症 (%)		16 (0.1)	41 (0.2)	619 (3.7)	196 (1.2)	1,188 (7.1)	5,779 (34.4)	2,761 (16.4)	4,049 (24.1)	418 (2.5)	471 (2.8)	1,035 (6.2)	156 (0.9)	73 (0.4)	16,802 (100.0)	158	16,960	224.32	39.77
SLE腎炎 (%)		1 (0.2)	2 (0.5)	12 (2.8)	13 (3.1)	49 (11.6)	152 (35.9)	72 (17.0)	81 (19.1)	8 (1.9)	14 (3.3)	17 (4.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	423 (100.0)	3	426	216.99	38.27
アミロイド腎 (%)				7 (9.7)	1 (1.4)	15 (20.8)	29 (40.3)	7 (9.7)	10 (13.9)		1 (1.4)	1 (1.4)	1 (1.4)		72 (100.0)	2	74	204.58	36.81
痛風腎 (%)				5 (3.0)	1 (0.6)	7 (4.2)	47 (28.5)	25 (15.2)	55 (33.3)	5 (3.0)	7 (4.2)	12 (7.3)	1 (0.6)		165 (100.0)	1	166	231.15	36.05
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (2.0)	3 (6.1)	2 (4.1)	18 (36.7)	8 (16.3)	15 (30.6)			2 (4.1)			49 (100.0)		49	218.98	31.57
腎・尿路結核 (%)					2 (6.5)	3 (9.7)	12 (38.7)	2 (6.5)	8 (25.8)	1 (3.2)		3 (9.7)			31 (100.0)		31	222.58	38.55
腎・尿路結石 (%)				4 (5.1)	1 (1.3)	8 (10.3)	24 (30.8)	16 (20.5)	19 (24.4)	1 (1.3)	1 (1.3)	4 (5.1)			78 (100.0)	1	79	219.10	34.76
腎・尿路腫瘍 (%)				2 (1.7)		9 (7.6)	44 (37.0)	23 (19.3)	31 (26.1)	2 (1.7)	4 (3.4)	4 (3.4)			119 (100.0)		119	222.44	31.14
閉塞性尿路障害 (%)				2 (1.9)	1 (1.0)	3 (2.9)	40 (38.8)	17 (16.5)	24 (23.3)	4 (3.9)	6 (5.8)	5 (4.9)	1 (1.0)		103 (100.0)	1	104	227.30	35.38
骨髄腫 (%)		1 (3.0)		3 (9.1)		1 (3.0)	15 (45.5)	6 (18.2)	6 (18.2)			1 (3.0)			33 (100.0)		33	208.18	36.95
腎形成不全 (%)			1 (0.7)	6 (4.4)		3 (2.2)	38 (27.9)	29 (21.3)	36 (26.5)	8 (5.9)	4 (2.9)	9 (6.6)	1 (0.7)	1 (0.7)	136 (100.0)		136	231.10	43.73
不明 (%)		6 (0.1)	19 (0.4)	208 (4.5)	70 (1.5)	367 (7.9)	1,616 (34.6)	681 (14.6)	1,043 (22.3)	92 (2.0)	157 (3.4)	323 (6.9)	67 (1.4)	22 (0.5)	4,671 (100.0)	32	4,703	223.84	42.47
再導入 (%)				7 (1.5)	3 (0.6)	27 (5.6)	138 (28.9)	87 (18.2)	135 (28.2)	18 (3.8)	25 (5.2)	31 (6.5)	4 (0.8)	3 (0.6)	478 (100.0)	5	483	233.05	40.69
その他 (%)		5 (0.4)	7 (0.6)	47 (4.1)	14 (1.2)	79 (6.9)	396 (34.5)	178 (15.5)	276 (24.0)	32 (2.8)	34 (3.0)	67 (5.8)	12 (1.0)	1 (0.1)	1,148 (100.0)	12	1,160	222.78	39.87
合計 (%)		53 (0.1)	111 (0.2)	1,653 (3.4)	610 (1.2)	3,455 (7.0)	16,418 (33.5)	8,228 (16.8)	11,989 (24.4)	1,273 (2.6)	1,493 (3.0)	3,092 (6.3)	463 (0.9)	240 (0.5)	49,078 (100.0)	497	49,575	225.30	40.32
記載なし (%)							2 (33.3)	3 (50.0)	1 (16.7)						6 (100.0)		6	218.33	16.02
総計 (%)		53 (0.1)	111 (0.2)	1,653 (3.4)	610 (1.2)	3,455 (7.0)	16,420 (33.5)	8,231 (16.8)	11,990 (24.4)	1,273 (2.6)	1,493 (3.0)	3,092 (6.3)	463 (0.9)	240 (0.5)	49,084 (100.0)	497	49,581	225.30	40.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査