

表 1930 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	48	281		1	330	1	73	404
(%)	(14.5)	(85.2)		(0.3)	(100.0)			
2年～	78	597			675		122	797
(%)	(11.6)	(88.4)			(100.0)			
5年～	108	887		2	997		152	1,149
(%)	(10.8)	(89.0)		(0.2)	(100.0)			
10年～	86	607		1	694		115	809
(%)	(12.4)	(87.5)		(0.1)	(100.0)			
15年～	46	451		1	498		50	548
(%)	(9.2)	(90.6)		(0.2)	(100.0)			
20年～	40	310			350		46	396
(%)	(11.4)	(88.6)			(100.0)			
25年～	35	252			287		32	319
(%)	(12.2)	(87.8)			(100.0)			
30年～	19	171		1	191		33	224
(%)	(9.9)	(89.5)		(0.5)	(100.0)			
35年～	19	105			124		14	138
(%)	(15.3)	(84.7)			(100.0)			
40年～	5	31			36		7	43
(%)	(13.9)	(86.1)			(100.0)			
合計	484	3,692		6	4,182	1	644	4,827
(%)	(11.6)	(88.3)		(0.1)	(100.0)			
不明		9			9			9
(%)		(100.0)			(100.0)			
記載なし								
(%)								
総計	484	3,701		6	4,191	1	644	4,836
(%)	(11.5)	(88.3)		(0.1)	(100.0)			
平均	12.61	12.76		11.83	12.74	1.00	11.39	12.56
標準偏差	10.46	10.00		10.55	10.06		9.99	10.06

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査