

表 1951 HDF希釈方法 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

透析前アルブミン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
1.5～ (%)	1 (5.9)	16 (94.1)			17 (100.0)		1	18
2.0～ (%)	13 (18.8)	56 (81.2)			69 (100.0)		13	82
2.5～ (%)	30 (11.7)	227 (88.3)			257 (100.0)		48	305
3.0～ (%)	133 (11.1)	1,064 (88.7)		3 (0.3)	1,200 (100.0)		176	1,376
3.5～ (%)	215 (11.0)	1,734 (88.9)		2 (0.1)	1,951 (100.0)	1	267	2,219
4.0～ (%)	77 (14.0)	471 (85.8)		1 (0.2)	549 (100.0)		72	621
4.5～ (%)	2 (11.1)	16 (88.9)			18 (100.0)		3	21
5.0～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)			3
合計 (%)	471 (11.6)	3,589 (88.3)		6 (0.1)	4,066 (100.0)	1	580	4,647
記載なし (%)	13 (10.4)	112 (89.6)			125 (100.0)		64	189
総計 (%)	484 (11.5)	3,701 (88.3)		6 (0.1)	4,191 (100.0)	1	644	4,836
平均	3.54	3.53		3.45	3.53	3.90	3.50	3.52
標準偏差	0.45	0.43		0.39	0.43		0.43	0.43

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査