

表 1957 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別(オフラインHDF透析回数週3回)

総コレステロール濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	16 (10.7)	133 (89.3)			149 (100.0)		30	179
100～ (%)	29 (9.2)	287 (90.8)			316 (100.0)		51	367
120～ (%)	93 (15.1)	522 (84.9)			615 (100.0)		83	698
140～ (%)	98 (12.9)	663 (87.0)		1 (0.1)	762 (100.0)		84	846
160～ (%)	81 (13.5)	521 (86.5)			602 (100.0)		103	705
180～ (%)	47 (11.2)	371 (88.5)		1 (0.2)	419 (100.0)		36	455
200～ (%)	19 (9.7)	176 (90.3)			195 (100.0)		28	223
220～ (%)	6 (6.3)	89 (93.7)			95 (100.0)		11	106
240～ (%)	3 (5.8)	48 (92.3)		1 (1.9)	52 (100.0)		6	58
260～ (%)	1 (4.3)	22 (95.7)			23 (100.0)		5	28
合計 (%)	393 (12.2)	2,832 (87.7)		3 (0.1)	3,228 (100.0)		437	3,665
記載なし (%)	91 (9.4)	869 (90.2)		3 (0.3)	963 (100.0)	1	207	1,171
総計 (%)	484 (11.5)	3,701 (88.3)		6 (0.1)	4,191 (100.0)	1	644	4,836
平均	153.46	156.52	190.00	156.18		153.50	155.86	
標準偏差	31.66	36.65	51.26	36.11		38.29	36.38	

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査