

表 1965 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	4,687	167		44	4,898		304	5,202
(%)	(95.7)	(3.4)		(0.9)	(100.0)			
2年～	8,244	336		86	8,666		614	9,280
(%)	(95.1)	(3.9)		(1.0)	(100.0)			
5年～	9,421	397	1	93	9,912		762	10,674
(%)	(95.0)	(4.0)	(0.0)	(0.9)	(100.0)			
10年～	5,485	238		47	5,770		513	6,283
(%)	(95.1)	(4.1)		(0.8)	(100.0)			
15年～	3,337	193		21	3,551		353	3,904
(%)	(94.0)	(5.4)		(0.6)	(100.0)			
20年～	2,181	127		6	2,314		211	2,525
(%)	(94.3)	(5.5)		(0.3)	(100.0)			
25年～	1,306	71		8	1,385		156	1,541
(%)	(94.3)	(5.1)		(0.6)	(100.0)			
30年～	774	48		3	825		102	927
(%)	(93.8)	(5.8)		(0.4)	(100.0)			
35年～	392	33		2	427		53	480
(%)	(91.8)	(7.7)		(0.5)	(100.0)			
40年～	126	7			133		13	146
(%)	(94.7)	(5.3)			(100.0)			
合計	35,953	1,617	1	310	37,881		3,081	40,962
(%)	(94.9)	(4.3)	(0.0)	(0.8)	(100.0)			
不明	41				41		3	44
(%)	(100.0)				(100.0)			
記載なし								
(%)								
総計	35,994	1,617	1	310	37,922		3,084	41,006
(%)	(94.9)	(4.3)	(0.0)	(0.8)	(100.0)			
平均	9.42	10.90	5.00	7.46	9.46		10.96	9.58
標準偏差	8.47	9.27		6.88	8.50		9.15	8.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査