

表 1985 HDF希釈方法 %クレアチニン産生速度(%)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,364 (94.3)	75 (5.2)		8 (0.6)	1,447 (100.0)		116	1,563
60～ (%)	1,310 (96.0)	46 (3.4)		8 (0.6)	1,364 (100.0)		110	1,474
70～ (%)	2,145 (95.2)	94 (4.2)		15 (0.7)	2,254 (100.0)		177	2,431
80～ (%)	3,479 (95.0)	166 (4.5)		19 (0.5)	3,664 (100.0)		286	3,950
90～ (%)	4,580 (95.1)	214 (4.4)		21 (0.4)	4,815 (100.0)		400	5,215
100～ (%)	5,301 (95.1)	239 (4.3)		33 (0.6)	5,573 (100.0)		397	5,970
110～ (%)	4,815 (94.7)	243 (4.8)		27 (0.5)	5,085 (100.0)		437	5,522
120～ (%)	3,531 (95.4)	150 (4.1)	1 (0.0)	19 (0.5)	3,701 (100.0)		282	3,983
130～ (%)	1,883 (94.7)	97 (4.9)		8 (0.4)	1,988 (100.0)		180	2,168
140～ (%)	1,304 (94.8)	62 (4.5)		10 (0.7)	1,376 (100.0)		108	1,484
合計 (%)	29,712 (95.0)	1,386 (4.4)	1 (0.0)	168 (0.5)	31,267 (100.0)		2,493	33,760
記載なし (%)	1,554 (90.6)	64 (3.7)		98 (5.7)	1,716 (100.0)		284	2,000
総計 (%)	31,266 (94.8)	1,450 (4.4)	1 (0.0)	266 (0.8)	32,983 (100.0)		2,777	35,760
平均	102.36	102.55	121.30	102.15	102.37		102.46	102.37
標準偏差	23.81	23.69		24.97	23.81		24.45	23.86

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査