

表 1987 HDF希釈方法 透析前CRP濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	18,840 (95.4)	810 (4.1)	1 (0.0)	104 (0.5)	19,755 (100.0)		1,448	21,203
0.2～ (%)	5,989 (95.0)	270 (4.3)		48 (0.8)	6,307 (100.0)		455	6,762
0.5～ (%)	2,931 (95.5)	117 (3.8)		21 (0.7)	3,069 (100.0)		220	3,289
1.0～ (%)	1,799 (95.0)	84 (4.4)		11 (0.6)	1,894 (100.0)		141	2,035
2.0～ (%)	958 (94.8)	47 (4.6)		6 (0.6)	1,011 (100.0)		97	1,108
4.0～ (%)	341 (93.4)	19 (5.2)		5 (1.4)	365 (100.0)		33	398
6.0～ (%)	153 (95.6)	5 (3.1)		2 (1.3)	160 (100.0)		17	177
8.0～ (%)	85 (95.5)	4 (4.5)			89 (100.0)		9	98
10.0～ (%)	76 (93.8)	4 (4.9)		1 (1.2)	81 (100.0)		6	87
15.0～ (%)	58 (87.9)	7 (10.6)		1 (1.5)	66 (100.0)		4	70
合計 (%)	31,230 (95.2)	1,367 (4.2)	1 (0.0)	199 (0.6)	32,797 (100.0)		2,430	35,227
記載なし (%)	4,764 (93.0)	250 (4.9)		111 (2.2)	5,125 (100.0)		654	5,779
総計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
平均	0.52	0.61	0.18	0.68	0.52		0.57	0.52
標準偏差	1.57	1.87		1.78	1.59		1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査