

表 1990 HDF希釈方法 PTH値(pg/mL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,239 (93.8)	69 (5.2)		13 (1.0)	1,321 (100.0)		111	1,432
20～ (%)	1,778 (95.9)	66 (3.6)		10 (0.5)	1,854 (100.0)		149	2,003
40～ (%)	2,016 (94.6)	103 (4.8)		12 (0.6)	2,131 (100.0)		152	2,283
60～ (%)	2,341 (95.4)	100 (4.1)		14 (0.6)	2,455 (100.0)		159	2,614
80～ (%)	2,521 (95.5)	104 (3.9)		16 (0.6)	2,641 (100.0)		183	2,824
100～ (%)	2,470 (95.8)	95 (3.7)		13 (0.5)	2,578 (100.0)		182	2,760
120～ (%)	2,450 (95.9)	88 (3.4)	1 (0.0)	17 (0.7)	2,556 (100.0)		165	2,721
140～ (%)	2,202 (94.8)	103 (4.4)		18 (0.8)	2,323 (100.0)		176	2,499
160～ (%)	2,032 (95.1)	92 (4.3)		13 (0.6)	2,137 (100.0)		182	2,319
180～ (%)	4,802 (96.2)	151 (3.0)		37 (0.7)	4,990 (100.0)		395	5,385
240～ (%)	53 (94.6)	2 (3.6)		1 (1.8)	56 (100.0)		4	60
241～ (%)	2,840 (95.5)	126 (4.2)		9 (0.3)	2,975 (100.0)		279	3,254
300～ (%)	1,642 (94.7)	81 (4.7)		11 (0.6)	1,734 (100.0)		154	1,888
360～ (%)	925 (94.3)	53 (5.4)		3 (0.3)	981 (100.0)		90	1,071
420～ (%)	573 (94.9)	30 (5.0)		1 (0.2)	604 (100.0)		55	659
480～ (%)	140 (94.0)	9 (6.0)			149 (100.0)		13	162
500～ (%)	220 (93.2)	15 (6.4)		1 (0.4)	236 (100.0)		19	255
540～ (%)	226 (96.6)	8 (3.4)			234 (100.0)		26	260
600～ (%)	412 (94.7)	21 (4.8)		2 (0.5)	435 (100.0)		35	470
800～ (%)	363 (91.7)	29 (7.3)		4 (1.0)	396 (100.0)		29	425
合計 (%)	31,245 (95.3)	1,345 (4.1)	1 (0.0)	195 (0.6)	32,786 (100.0)		2,558	35,344
記載なし (%)	553 (93.4)	35 (5.9)		4 (0.7)	592 (100.0)		30	622
総計 (%)	31,798 (95.3)	1,380 (4.1)	1 (0.0)	199 (0.6)	33,378 (100.0)		2,588	35,966
平均	184.52	197.71	133.00	177.17	185.01		194.61	185.71
標準偏差	177.48	197.63		195.08	178.47		179.96	178.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査