

表 1992 HDF希釈方法 総コレステロール濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

総コレステロール濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	776 (94.6)	37 (4.5)		7 (0.9)	820 (100.0)		73	893
100～ (%)	2,609 (95.7)	100 (3.7)		17 (0.6)	2,726 (100.0)		212	2,938
120～ (%)	5,385 (95.3)	233 (4.1)		30 (0.5)	5,648 (100.0)		441	6,089
140～ (%)	6,753 (95.6)	273 (3.9)		38 (0.5)	7,064 (100.0)		562	7,626
160～ (%)	5,867 (94.9)	277 (4.5)		41 (0.7)	6,185 (100.0)		477	6,662
180～ (%)	3,941 (94.8)	193 (4.6)		21 (0.5)	4,155 (100.0)		367	4,522
200～ (%)	2,144 (94.0)	121 (5.3)		16 (0.7)	2,281 (100.0)		178	2,459
220～ (%)	1,001 (94.1)	58 (5.5)		5 (0.5)	1,064 (100.0)		88	1,152
240～ (%)	370 (93.9)	23 (5.8)		1 (0.3)	394 (100.0)		30	424
260～ (%)	227 (92.7)	16 (6.5)		2 (0.8)	245 (100.0)		17	262
合計 (%)	29,073 (95.1)	1,331 (4.4)		178 (0.6)	30,582 (100.0)		2,445	33,027
記載なし (%)	6,921 (94.3)	286 (3.9)	1 (0.0)	132 (1.8)	7,340 (100.0)		639	7,979
総計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
平均	159.48	163.49		159.79	159.65		159.79	159.66
標準偏差	35.46	37.46		38.42	35.58		35.72	35.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査