

表 1999 1セッションあたりの置換液量(L) 年齢(歳)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

年齢	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)											
15歳～ (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	25.00	
30歳～ (%)		1 (3.6)	9 (32.1)	9 (32.1)	2 (7.1)	7 (25.0)	28 (100.0)	3	31	13.57	7.99
45歳～ (%)		10 (10.3)	31 (32.0)	33 (34.0)	3 (3.1)	20 (20.6)	97 (100.0)	4	101	12.01	7.60
60歳～ (%)		28 (13.6)	81 (39.3)	61 (29.6)	2 (1.0)	34 (16.5)	206 (100.0)	12	218	10.72	7.37
75歳～ (%)		17 (14.3)	62 (52.1)	28 (23.5)	1 (0.8)	11 (9.2)	119 (100.0)	5	124	9.02	5.60
90歳～ (%)		3 (33.3)	5 (55.6)			1 (11.1)	9 (100.0)		9	7.22	6.67
合計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16
平均		69.27	68.40	63.86	54.38	62.42	66.01	64.63	65.94		
標準偏差		11.32	12.60	12.20	17.44	14.46	13.05	12.73	13.03		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査