

表 2001 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別（オフラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

原疾患	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		23 (10.9)	85 (40.3)	60 (28.4)	4 (1.9)	39 (18.5)	211 (100.0)	14	225	11.28	7.36
慢性腎盂腎炎 (%)				3 (100.0)			3 (100.0)		3	10.67	1.15
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			3 (60.0)	2 (40.0)			5 (100.0)		5	8.40	1.67
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	1 (50.0)			1 (50.0)			2 (100.0)		2	7.00	4.24
その他の分類不能 の腎炎 (%)			2 (50.0)	2 (50.0)			4 (100.0)		4	8.00	2.31
多発性嚢胞腎 (%)	3 (21.4)	6 (42.9)	4 (28.6)			1 (7.1)	14 (100.0)		14	8.43	5.40
腎硬化症 (%)	3 (18.8)	7 (43.8)	6 (37.5)				16 (100.0)		16	7.94	2.59
悪性高血圧 (%)			1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	16.00	12.49
糖尿病性腎症 (%)	21 (14.3)	63 (42.9)	37 (25.2)		2 (1.4)	24 (16.3)	147 (100.0)	8	155	10.42	7.35
SLE腎炎 (%)				2 (66.7)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	16.67	11.55
アミロイド腎 (%)											
痛風腎 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00	
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)						1 (100.0)	1 (100.0)		1	25.00	
腎・尿路結核 (%)											
腎・尿路結石 (%)											
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	14.67	8.33
閉塞性尿路障害 (%)			1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)		2	15.00	12.73
骨髄腫 (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	7.00	1.41
腎形成不全 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	8.00	
不明 (%)	5 (19.2)	11 (42.3)	7 (26.9)		1 (3.8)	2 (7.7)	26 (100.0)	2	28	8.81	6.02
再導入 (%)			1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	5 (100.0)		5	13.00	7.28
その他 (%)	3 (27.3)	3 (27.3)	3 (27.3)			2 (18.2)	11 (100.0)		11	10.64	8.56
合計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16
記載なし (%)											
総計 (%)		59 (12.8)	188 (40.9)	131 (28.5)	8 (1.7)	74 (16.1)	460 (100.0)	24	484	10.69	7.16

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査