

表 2026 1セッションあたりの置換液量(L) 性別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

| 性別          | 1未満 | 1～           | 5～           | 10～            | 15～          | 20～             | 30～             | 40～              | 50～            | 60～             | 70～          | 80～          | 90～          | 合計                | 記載なし | 総計     | 平均    | 標準偏差  |
|-------------|-----|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------|--------|-------|-------|
| 男性<br>(%)   |     | 104<br>(0.5) | 380<br>(1.7) | 711<br>(3.1)   | 433<br>(1.9) | 3,105<br>(13.6) | 3,933<br>(17.2) | 9,055<br>(39.5)  | 1,739<br>(7.6) | 2,539<br>(11.1) | 548<br>(2.4) | 252<br>(1.1) | 108<br>(0.5) | 22,907<br>(100.0) | 401  | 23,308 | 41.21 | 15.45 |
| 女性<br>(%)   |     | 73<br>(0.6)  | 333<br>(2.7) | 481<br>(3.9)   | 352<br>(2.8) | 1,987<br>(16.0) | 2,573<br>(20.7) | 4,448<br>(35.8)  | 734<br>(5.9)   | 1,069<br>(8.6)  | 237<br>(1.9) | 88<br>(0.7)  | 40<br>(0.3)  | 12,415<br>(100.0) | 271  | 12,686 | 38.42 | 15.45 |
| 合計<br>(%)   |     | 177<br>(0.5) | 713<br>(2.0) | 1,192<br>(3.4) | 785<br>(2.2) | 5,092<br>(14.4) | 6,506<br>(18.4) | 13,503<br>(38.2) | 2,473<br>(7.0) | 3,608<br>(10.2) | 785<br>(2.2) | 340<br>(1.0) | 148<br>(0.4) | 35,322<br>(100.0) | 672  | 35,994 | 40.23 | 15.50 |
| 記載なし<br>(%) |     |              |              |                |              |                 |                 |                  |                |                 |              |              |              |                   |      |        |       |       |
| 総計<br>(%)   |     | 177<br>(0.5) | 713<br>(2.0) | 1,192<br>(3.4) | 785<br>(2.2) | 5,092<br>(14.4) | 6,506<br>(18.4) | 13,503<br>(38.2) | 2,473<br>(7.0) | 3,608<br>(10.2) | 785<br>(2.2) | 340<br>(1.0) | 148<br>(0.4) | 35,322<br>(100.0) | 672  | 35,994 | 40.23 | 15.50 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査