

表 2029 1セッションあたりの置換液量(L) 原疾患別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

原疾患	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)		54 (0.4)	216 (1.8)	415 (3.4)	203 (1.7)	1,533 (12.5)	2,098 (17.1)	4,708 (38.5)	1,073 (8.8)	1,420 (11.6)	328 (2.7)	141 (1.2)	55 (0.4)	12,244 (100.0)	240	12,484	41.60	15.59
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (1.1)	8 (2.3)	15 (4.3)	4 (1.1)	52 (14.8)	58 (16.5)	143 (40.7)	24 (6.8)	37 (10.5)	4 (1.1)	1 (0.3)	1 (0.3)	351 (100.0)	7	358	39.27	15.13
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (0.4)	5 (2.0)	10 (4.0)	4 (1.6)	41 (16.4)	52 (20.8)	82 (32.8)	12 (4.8)	27 (10.8)	11 (4.4)	3 (1.2)	2 (0.8)	250 (100.0)	9	259	40.34	16.63
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		1 (0.4)	2 (0.7)	14 (5.1)	5 (1.8)	43 (15.6)	45 (16.3)	102 (37.0)	18 (6.5)	27 (9.8)	12 (4.3)	7 (2.5)		276 (100.0)	7	283	41.34	16.61
その他の分類不 能の腎炎 (%)		1 (0.6)	4 (2.4)	5 (3.0)	3 (1.8)	16 (9.7)	23 (13.9)	68 (41.2)	15 (9.1)	20 (12.1)	6 (3.6)	2 (1.2)	2 (1.2)	165 (100.0)	6	171	43.12	16.35
多発性嚢胞腎 (%)		6 (0.4)	31 (2.2)	40 (2.8)	27 (1.9)	198 (14.1)	251 (17.8)	588 (41.8)	101 (7.2)	126 (8.9)	26 (1.8)	9 (0.6)	5 (0.4)	1,408 (100.0)	23	1,431	40.29	14.71
腎硬化症 (%)		16 (0.6)	72 (2.6)	129 (4.7)	90 (3.2)	534 (19.3)	533 (19.2)	979 (35.3)	127 (4.6)	210 (7.6)	53 (1.9)	21 (0.8)	9 (0.3)	2,773 (100.0)	60	2,833	37.36	15.61
悪性高血圧 (%)			4 (1.3)	6 (2.0)	7 (2.3)	34 (11.4)	51 (17.1)	119 (39.8)	33 (11.0)	34 (11.4)	7 (2.3)	2 (0.7)	2 (0.7)	299 (100.0)	3	302	42.55	14.57
糖尿病性腎症 (%)		52 (0.4)	233 (1.9)	392 (3.3)	287 (2.4)	1,901 (15.8)	2,314 (19.2)	4,670 (38.7)	700 (5.8)	1,133 (9.4)	226 (1.9)	98 (0.8)	49 (0.4)	12,055 (100.0)	210	12,265	39.53	15.20
SLE腎炎 (%)		4 (1.3)	6 (2.0)	9 (2.9)	2 (0.7)	43 (14.0)	60 (19.5)	118 (38.4)	24 (7.8)	36 (11.7)	4 (1.3)		1 (0.3)	307 (100.0)	6	313	39.98	14.66
アミロイド腎 (%)			1 (2.0)		1 (2.0)	16 (32.7)	7 (14.3)	19 (38.8)	3 (6.1)	2 (4.1)				49 (100.0)	2	51	35.71	12.27
痛風腎 (%)		1 (0.8)		3 (2.5)	1 (0.8)	12 (10.1)	20 (16.8)	45 (37.8)	16 (13.4)	17 (14.3)	3 (2.5)	1 (0.8)		119 (100.0)	1	120	43.63	14.05
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				1 (2.9)		5 (14.3)	7 (20.0)	15 (42.9)	1 (2.9)	5 (14.3)	1 (2.9)			35 (100.0)	1	36	41.54	13.70
腎・尿路結核 (%)			2 (8.3)	2 (8.3)	1 (4.2)	1 (4.2)	5 (20.8)	11 (45.8)	1 (4.2)	1 (4.2)				24 (100.0)		24	34.67	15.57
腎・尿路結石 (%)		1 (1.7)	1 (1.7)	2 (3.4)	1 (1.7)	10 (16.9)	17 (28.8)	18 (30.5)	3 (5.1)	5 (8.5)	1 (1.7)			59 (100.0)	2	61	36.93	14.68
腎・尿路腫瘍 (%)			2 (2.5)	7 (8.6)	5 (6.2)	12 (14.8)	10 (12.3)	30 (37.0)	3 (3.7)	10 (12.3)	1 (1.2)		1 (1.2)	81 (100.0)		81	37.36	17.06
閉塞性尿路障害 (%)		1 (1.4)	1 (1.4)	2 (2.8)	1 (1.4)	7 (9.7)	18 (25.0)	28 (38.9)	3 (4.2)	8 (11.1)	2 (2.8)	1 (1.4)		72 (100.0)	4	76	40.35	14.95
骨髄腫 (%)			1 (4.5)				3 (13.6)	7 (31.8)	7 (31.8)	4 (18.2)				22 (100.0)	1	23	40.86	15.16
腎形成不全 (%)			1 (1.1)	3 (3.2)	1 (1.1)	7 (7.4)	14 (14.7)	40 (42.1)	8 (8.4)	15 (15.8)	4 (4.2)	1 (1.1)	1 (1.1)	95 (100.0)	1	96	45.65	16.64
不明 (%)		27 (0.8)	96 (2.8)	105 (3.0)	118 (3.4)	467 (13.4)	695 (20.0)	1,274 (36.7)	225 (6.5)	346 (10.0)	69 (2.0)	39 (1.1)	15 (0.4)	3,476 (100.0)	60	3,536	39.53	15.85
再導入 (%)		2 (0.6)	4 (1.1)	12 (3.4)	4 (1.1)	27 (7.8)	71 (20.4)	135 (38.8)	33 (9.5)	47 (13.5)	8 (2.3)	3 (0.9)	2 (0.6)	348 (100.0)	4	352	43.09	14.99
その他 (%)		7 (0.9)	21 (2.6)	20 (2.5)	19 (2.4)	128 (15.8)	149 (18.4)	303 (37.5)	50 (6.2)	78 (9.7)	19 (2.4)	11 (1.4)	3 (0.4)	808 (100.0)	25	833	39.90	15.95
合計		177 (0.5)	712 (2.0)	1,192 (3.4)	784 (2.2)	5,090 (14.4)	6,505 (18.4)	13,502 (38.2)	2,473 (7.0)	3,608 (10.2)	785 (2.2)	340 (1.0)	148 (0.4)	35,316 (100.0)	672	35,988	40.23	15.50
記載なし (%)			1 (16.7)		1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)						6 (100.0)		6	27.00	13.83
総計		177 (0.5)	713 (2.0)	1,192 (3.4)	785 (2.2)	5,092 (14.4)	6,506 (18.4)	13,503 (38.2)	2,473 (7.0)	3,608 (10.2)	785 (2.2)	340 (1.0)	148 (0.4)	35,322 (100.0)	672	35,994	40.23	15.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査