

表 2059 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学			17	4			21		21	8.10	1.18
(%)			(81.0)	(19.0)			(100.0)				
私立大学		1	13	3			17		17	7.59	1.91
(%)		(5.9)	(76.5)	(17.6)			(100.0)				
国立			12	1			13		13	8.08	0.64
(%)			(92.3)	(7.7)			(100.0)				
県市町村立		30	129	102	1		262	19	281	8.08	2.43
(%)		(11.5)	(49.2)	(38.9)	(0.4)		(100.0)				
社会保険		1	10	10			21		21	8.76	2.23
(%)		(4.8)	(47.6)	(47.6)			(100.0)				
厚生連		17	62	32		2	113	1	114	7.99	3.77
(%)		(15.0)	(54.9)	(28.3)		(1.8)	(100.0)				
その他公的		8	73	30		1	112	2	114	8.19	2.27
(%)		(7.1)	(65.2)	(26.8)		(0.9)	(100.0)				
私立総合		15	63	34			112	4	116	7.62	2.23
(%)		(13.4)	(56.3)	(30.4)			(100.0)				
私立		116	590	411	5		1,122	57	1,179	7.86	2.33
(%)		(10.3)	(52.6)	(36.6)	(0.4)		(100.0)				
私立診療所		99	915	736	1		1,751	74	1,825	8.20	1.99
(%)		(5.7)	(52.3)	(42.0)	(0.1)		(100.0)				
総計		287	1,884	1,363	7	3	3,544	157	3,701	8.06	2.23
(%)		(8.1)	(53.2)	(38.5)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査